



SCORE DE TRASLADO PEDIÁTRICO

El score de traslado propuesto se aplicará en pacientes que precisen un traslado en ambulancia y tras una valoración exhaustiva previa por el médico que ha atendido al paciente.

La puntuación del score se obtiene considerando la valoración objetiva de signos vitales que reflejan el estado fisiopatológico del paciente y su necesidad de soporte vital.

Este score **no se debe usar** como ayuda para determinar si la situación de un paciente requiere o no un traslado en ambulancia.

Score predictivo* del tipo de recurso para traslados		
Oxigenoterapia	No	0
	Naricera o Mascarilla Venturi	1
	Mascarilla reservorio	4
Respiratorio	Normal para la edad	0
	FR>p90 o < p10 (ver Detección Temprana Deterioro Clínico (MPEWS)) o patrón respiratorio anormal	3
	Soporte respiratorio (CPAP, alto flujo, VM)	4
Hemodinámico	Estable. No necesidad de acceso de venoso.	0
	Estable con necesidad de acceso venoso o de infusión lenta de sueroterapia.	1
	Inestable (alteración de FC o TA, ver Detección Temprana Deterioro Clínico (MPEWS)) o necesidad de infusión rápida de volumen IV o canalización de vía intraósea	4
Neurológico CGS o AVDN	15 (normal)	0
	14 o respuesta al estímulo verbal (V)	3
	≤ 13 o solo respuesta al dolor (D) o no respuesta	4
Necesidad de monitorización	No	0
	FC y saturación de O2 continua	1
	Monitorización cardiopulmonar completa	4
Necesidad de medicación de emergencia	No	0
	Alguno/s de los siguientes: β-2 inhalado, adrenalina nebulizada (1 dosis), opioide IN/SC/IV (1dosis)	1
	Alguno/s de los siguientes: anticomiciales, adenosina IV, adrenalina IM/IV, expansión con Suero Fisiológico, más de una dosis de adrenalina nebulizada u opioides IN/SC/IV	4

Interpretación

Puntuación	Tipo de recurso
0*- sumatorio de 4	Soporte Vital Básico (SVB)
Único 4 o sumatorio ≥ 5	Soporte Vital Avanzado (SVA) con médico o con enfermería

*Si puntuación de 0: valorar traslado en vehículo particular (según caso)